

INTRODUCTION DU FRELON ASIATIQUE EN FRANCE

Le frelon asiatique a été introduit accidentellement en France en 2004 dans le Lot-et-Garonne via des poteries importées de Chine. Depuis, il s'est largement propagé et fait preuve d'une capacité d'adaptation remarquable. Il génère des problèmes multiples et représente une réelle menace pour la biodiversité, l'apiculture et les espèces locales : abeille, frelon européen et l'homme (piqûres, etc...)

UNE ESPECE CLASSÉE NUISIBLE

La menace du frelon asiatique est réelle.

La situation devient préoccupante aussi bien pour la filière apicole (attaque des ruches) que pour l'écosystème.

Plus petit que le frelon européen, il se distingue par sa coloration sombre, son abdomen avec une bande orangée et ses pattes jaunes.

Son régime alimentaire se compose d'abeilles, de larves diverses, de petits vertébrés et de fruits mûrs (pommes, raisins)...

FRELON ASIATIQUE



Mesure **moins de 30mm**
Abdomen **noir avec une bande orangée**
Couleur des pattes **nettement jaune**

TRÈS AGRESSIF
ATTAQUE EN GROUPE

FRELON EUROPÉEN



Mesure **35mm**
Abdomen de **couleur jaune**
Couleur des pattes **brun rougeâtre**

CYCLE DE VIE DU FRELON ASIATIQUE

JANVIER | FÉVRIER | MARS | AVRIL | MAI | JUIN | JUILLET | AOÛT | SEPTEMBRE | OCTOBRE | NOVEMBRE | DÉCEMBRE

Il faut piéger les fondatrices avant la ponte

Il faut repérer les nids

Il faut piéger les fondatrices avant hibernation

COMMENT LE PIÉGER ?

Un piège simple peut être réalisé à partir d'une bouteille de plastique vide :

- > mettre au fond de la bouteille :
 - 1/3 de BIÈRE
 - 1/3 de SIROP DE CASSIS/GRENADINE
 - 1/3 de VIN BLANC


Respecter les ingrédients pour éviter de piéger des espèces non désirées.

La réalisation de plusieurs pièges augmente les chances de capture.

Vous pouvez disposer vos pièges de mi-février à fin avril (*Printemps*)

et de mi-octobre à fin novembre (*Automne*)

Il faut les retirer en mai afin d'éviter de capturer des espèces autochtones non désirées (frelon européen, guêpe...)



fondatrice

SI VOUS VOYEZ UN NID

Contactez au plus vite votre mairie ou les pompiers

Les nids du frelon asiatique sont le plus souvent très aériens, situés dans les arbres, d'où la difficulté pour les détruire.

Ils sont constitués de particules de bois et d'écorces enduites de salive. Les ouvrières meurent à la suite des premiers froids. Les femelles survivantes, appelées reines ou fondatrices, quittent le nid pour aller hiverner à l'abri. Au printemps suivant, ces fondatrices se réactivent et entreprennent la construction d'un nouveau nid.

La taille du nid peut atteindre **1 m de hauteur et 80 cm de diamètre !**

> Ne pas s'approcher du nid à moins de 15 mètres
Danger de piqûre et projection de venin !

> oedème > arrêt cardiaque > allergie > risque mortel